

Cygne tuberculé



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	plat – rouge orange – tubercule frontal
- Tête	blanche
- Corps	blanc
- Ailes	blanches
- Pattes	palmées – noires
- Queue	longue
- Autre	très long cou

Astuce

Le mâle possède un tubercule plus développé que la femelle, d'autant plus en période de nidification. Les juvéniles, au plumage gris, vont progressivement devenir blancs. Leur bec gris foncé sans tubercule deviendra petit à petit rouge orangé avec un tubercule frontal.

Oie cendrée



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant
Présent d'octobre à mi-février

Caractéristiques

- Bec	plat et fort – orange rosé
- Tête	gris brun
- Corps	gris brun
- Ailes	gris brun
- Pattes	palmées – rouges
- Queue	courte
- Autre	cou long – épais – trapu

Astuce

L'Oie cendrée est l'oie grise la plus commune observable dans la réserve ; l'Oie rieuse est rare et l'Oie des moissons très rare.

Tadorne de Belon



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant
Présent d'octobre à avril

Caractéristiques

- Bec	plat – rouge – tubercule
- Tête	verte foncée – noire
- Corps	dominante blanc – bande pectorale brun roux
- Ailes	rémyges primaires noires rémyges secondaires vertes
- Pattes	palmées – roses
- Queue	blanche avec l'extrémité noire

Astuce

Le tubercule frontal est plus gros chez le mâle que chez la femelle particulièrement en période de reproduction. Les couleurs du plumage du tadorne sont très nettement délimitées. Si ses teintes de plumes se rapprochent de celles du Canard souchet, le Tadorne de Belon est bien le plus grand des canards avec un long cou.

Canard colvert



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – jaune
- Tête	vert bouteille
- Corps	dominante gris – poitrine brun – collier blanc
- Ailes	miroir bleu entouré de bandes alaires blanches
- Pattes	palmées – orangées
- Queue	rectrices recourbées vers le haut

Astuce

Il y a un net dimorphisme sexuel chez le Canard colvert. La femelle est brunâtre et son bec orangé. Le juvénile a un plumage ressemblant à celui de la femelle.

Après la période nuptiale, à l'approche de l'été, le mâle mue, il perd une partie de ses plumes (notamment les rémiges) ; on dit qu'il est en éclipse.

Canard chipeau



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – sombre
- Tête	brun terne
- Corps	dominante gris – croupion noir
- Ailes	présence d'un miroir blanc bordé de noir
- Pattes	palmées – orangées
- Queue	croupion noir

Astuce

Il y a un net dimorphisme sexuel chez le Canard chipeau. La femelle chipeau ressemble beaucoup à la femelle colvert. Son bec est cependant bicolore (orange et gris) et son miroir est blanc. Le mâle chipeau connaît également une période de mue post-nuptiale et son plumage en éclipse ressemble à celui de la femelle.

Canard pilet



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant
Présent de mi-septembre à mi-avril

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – gris sombre
- Tête	noire
- Corps	poitrine et cou blancs
- Ailes	étroites et pointues
- Pattes	palmées – grises
- Queue	« en flèche » longue et pointue
- Autre	« languettes » fines blanches remontant vers la tête

Astuce

Il y a un net dimorphisme sexuel chez le Canard pilet. La femelle pilet ressemble beaucoup à la femelle colvert. Elle possède cependant un bec gris foncé. Le plumage du juvénile se rapproche de celui de la femelle.

Canard souchet



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – proéminent – gris
- Tête	vert bouteille – yeux jaunes
- Corps	poitrine blanche – ventre blanc – flancs brun-roux
- Ailes	couvertures bleues
- Pattes	palmées – oranges
- Queue	noire

Astuce

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Canard souchet. La femelle souchet ressemble beaucoup à la femelle colvert avec un bec proéminent. Le plumage du juvénile et du mâle en éclipse (il mue en période post-nuptiale) se rapprochent de celui de la femelle.

Canard siffleur



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Etangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant
Présent de mi-septembre à mi-mai

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – petit – gris clair avec la pointe noire
- Tête	brun-roux – front et calotte jaunes
- Corps	dominante gris – poitrine rosée – ventre blanc – « miroir » blanc
- Ailes	grisées avec une grande zone blanche
- Pattes	palmées
- Queue	noire

Astuce

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Canard siffleur. La femelle a des couleurs brun-roux ou grisâtre, le juvénile également ainsi que le mâle en éclipse.

Sarcelle d'hiver



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – gris
- Tête	brun-rouge – zone verte bordée d'une ligne jaune
- Corps	dominante gris – poitrine claire
- Ailes	raie blanche – miroir vert
- Pattes	palmées
- Queue	dessous jaune clair bordé de noir

Astuce

C'est un petit canard.

Il y a un dimorphisme sexuel chez la Sarcelle d'hiver. La femelle est tachetée de brun, le juvénile également ainsi que le mâle en éclipse.

Les mâles émettent un sifflement clair.

Sarcelle d'été



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Etangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent de mi-mars à mi-septembre

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – long – fort – gris
- Tête	brune – sourcil épais blanc
- Corps	dominante brun – flancs gris clair
- Ailes	grises
- Pattes	palmées
- Queue	brune

Astuce

Il y a un dimorphisme sexuel chez la Sarcelle d'été. La femelle Sarcelle d'été ressemble à la femelle Sarcelle d'hiver mais elle est plus grande. Le mâle Sarcelle d'été émet un bruit de crécelle sec.

Fuligule milouin



Statut « RNN Etangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – noir avec zone pâle
- Tête	brun-rouille – yeux rouges
- Corps	dominante gris – poitrine noire
- Ailes	grises
- Pattes	palmées
- Queue	courte – noire

Astuce

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Fuligule milouin. La femelle est gris-brunâtre avec la poitrine, le cou et la calotte brunâtres plus foncés. Les juvéniles lui ressemblent.

Fuligule morillon



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)

- Bec	plat – gris clair avec la pointe noire
- Tête	noire avec une huppe – yeux rouges
- Corps	dominante noir (poitrine, dos et queue) – flancs et ventre blancs
- Ailes	noire avec une barre alaire blanche
- Pattes	palmées
- Queue	noire

Astuce

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Fuligule morillon. La femelle est brune avec les flancs plus clairs. Les juvéniles lui ressemblent. Les mâles en éclipse ont les flancs bruns.

Grèbe à cou noir



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent de mars à mi-juillet

Caractéristiques

- Bec	pointu – petit
- Tête	noire – plumets jaunes – yeux rouges
- Corps	dominante noir (poitrine, dos, cou et tête) – flancs brun-roux
- Ailes	noire avec une barre alaire blanche
- Pattes	lobées
- Queue	quasi inexistante

Astuce

Le Grèbe à cou noir en plumage internuptial a perdu ses couleurs chaudes (flancs gris, tête noire et blanche). Comme les autres grèbes, il va plonger pour se nourrir. Il avale ses proies sous l'eau.

Grèbe castagneux



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	pointu – petit
- Tête	noire – commissures jaunes claires
- Corps	dominante noir avec un cou et des joues brun-rouge
- Ailes	noire avec une tache blanche
- Pattes	lobées
- Queue	quasi inexistante

Astuce

Le Grèbe castagneux est le plus petit des grèbes. L'adulte en plumage internuptial est plus terne. Comme les autres grèbes, il va plonger pour se nourrir. Le Grèbe castagneux a un régime diversifié : insectes, poissons, mollusques, crustacés, œufs d'amphibiens ...

Grèbe huppé



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	pointu – long – fin – couleur pâle
- Tête	plumes noires pouvant se dresser en huppe – joues brun-roux
- Corps	allongé – dominante clair – dos sombre
- Ailes	noire avec des taches blanches à l'avant et à l'arrière de l'aile
- Pattes	lobées
- Queue	quasi inexistante

Astuce

Le Grèbe huppé est le plus grand grèbe et le plus répandu. La parade nuptiale correspond à une danse en miroir entre la femelle et le mâle, cou dressé se repliant et pouvant aller jusqu'à une posture verticale du corps.

Butor étoilé



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant
Présent de mi-novembre à mi-mars

Caractéristiques

- Bec	pointu – long – droit
- Tête	brun-chamois – « moustaches » noires
- Corps	brun-chamois – trapu
- Ailes	larges – brunes
- Pattes	longueur moyenne – longs doigts
- Queue	petite

Astuce

Pour se camoufler dans les roseaux, le Butor étoilé imite les roseaux, en étirant son cou et en pointant son bec vers le ciel.

Blongios nain



Reserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLÉS D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur
Présent entre mai et mi-septembre

Caractéristiques du mâle

- Bec	pointu – long – droit
- Tête	grise – calotte et dessus noirs
- Corps	dominante brun-chamois (légèrement strié) – dos noir
- Ailes	noires - tache alaire blanc-beigeâtre « dans le noir »
- Pattes	longues – longs doigts
- Queue	petite

Astuce

Le Blongios nain est un « héron » de petite taille. La femelle a le dos brun strié de noir ; les stries du cou et des flancs sont plus marquées.

Bihoreau gris



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur
Présent entre juin et août

Caractéristiques

- Bec	pointu – court – droit – noir
- Tête	blanche – calotte noire – aigrettes (grandes plumes) blanches
- Corps	dominante gris pâle – dos gris ardoise trapu
- Ailes	gris pâle
- Pattes	longues – longs doigts
- Queue	petite

Astuce

Le Bihoreau gris est un « héron » de taille moyenne surtout actif au crépuscule et la nuit. Le jour, il dort dans les arbres.

Héron garde-bœufs



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur
Présent entre avril et octobre

Caractéristiques

- Bec	pointu – court – droit – jaune (rosé en période de reproduction)
- Tête	blanche – calotte orangée
- Corps	blanc – plumes orangées sur la poitrine et sur le dos – trapu
- Ailes	blanches
- Pattes	longues – couleur sombre – longs doigts
- Queue	petite

Astuce

Le Héron garde-bœufs est un « héron » de petite taille. C'est lui qui vient en groupe dans les champs où pâture le bétail pour se nourrir des insectes champêtres.

Aigrette garzette



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent entre mai et décembre

Caractéristiques

- Bec	pointu – long – droit – noir
- Tête	blanche – aigrettes (deux longues plumes fines) blanches
- Corps	blanc – long cou
- Ailes	blanches
- Pattes	longues – noires – longs doigts jaunes
- Queue	blanche

Astuce

L'Aigrette garzette est un « héron » de taille moyenne qui se nourrit de grenouilles, de poissons ...

Grande aigrette



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	pointu – long – droit – jaune
- Tête	blanche
- Corps	blanc – long cou
- Ailes	blanches
- Pattes	longues – sombres
- Queue	blanche

Astuce

La Grande aigrette est un « héron » de grande taille qui se nourrit de grenouilles, de poissons ... Les adultes nicheurs vont avoir un bec plus sombre que ceux qui ne nichent pas.

Héron cendré



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	pointu – long – droit – jaune
- Tête	blanche et noire – longue plume nucale noire
- Corps	dominante gris – gris / noir / blanc
- Ailes	grises
- Pattes	longues – jaunes
- Queue	grise

Astuce

En vol, le Héron cendré a le cou replié et les pattes étendues avec les doigts resserrés. Il niche en groupe en faisant de grands nids en haut des arbres ; c'est ce que l'on appelle les héronnières.

Vidéo de la héronnière

Balbusard pêcheur



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre mi-mars et mi-octobre
(+ quelques données hivernales)

Caractéristiques

- Bec	crochu
- Tête	calotte blanche – bande marron sur les yeux
- Corps	dominante blanc – dessus brun-gris
- Ailes	digitées – dominante brun sombre
- Pattes	serres
- Queue	en forme d'éventail en vol – finement barrée

Astuce

Le Balbusard pêcheur se nourrit exclusivement de poissons qu'il détecte depuis les airs. Il plonge alors sur les poissons, serres en avant.

Busard des roseaux



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur

Présent entre mi-mars et novembre

Caractéristiques du mâle

- Bec	crochu
- Tête	blanc-jaunâtre
- Corps	brun-roux – dos et ventre bruns
- Ailes	digitées – grises – dessous et dessus des ailes tricolores – pointes noires
- Pattes	serres
- Queue	longue – forme « plate » – gris-bleu clair uni

Astuce

Le Busard des roseaux chasse en rasant les milieux, ailes en V, à la recherche de petits mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens... La femelle de couleur brun foncé possède une calotte et un cou blanc moiré.

Avocette élégante



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre avril et mai
(+ quelques données en octobre)

Caractéristiques

- Bec	fin – long – retroussé – noir
- Tête	blanche – front, calotte et nuque noirs
- Corps	dominante blanc – un peu de noir
- Ailes	noires et blanches
- Pattes	longues – palmées – grises
- Queue	blanche

Astuce

L'Avocette élégante pêche les invertébrés de manière typique avec des mouvements latéraux du bec dans l'eau ou la vase liquide.

Échasse blanche



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur
Présent entre avril et juin

Caractéristiques

- Bec	pointu – long – fin – noir
- Tête	blanche et noire
- Corps	blanc
- Ailes	noires – pointues
- Pattes	très longues – fines – roses
- Queue	longue – pointue

Astuce

L'Échasse blanche est un limicole gracile et « élégant ». En vol, son cou et ses pattes sont en extension. Chez la femelle, la tête est blanche et grise, comme chez les juvéniles.

Petit gravelot



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre mars et novembre

Caractéristiques

- Bec	court – fin – sombre
- Tête	calotte marron et noire séparée par une ligne blanche – cercles orbitaires de couleur jaune
- Corps	dos gris-brun – ventre blanc – collier noir
- Ailes	brunes
- Pattes	longues – roses ternes
- Queue	noire et blanche

Astuce

Le Petit gravelot est un peu plus petit que le Grand gravelot. Son bec est plus étroit et long, il paraît avoir des pattes plus longues et il n'a pas de barre alaire blanche.

Grand gravelot



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre mars et novembre

Caractéristiques

- Bec	court – droit – épais – bicolore (orange avec la pointe noire)
- Tête	calotte brune sans délimitation blanche
- Corps	dominant blanc – dos gris-brun
- Ailes	brunes – barre alaire blanche
- Pattes	courtes – orangées
- Queue	noire – blanche

Astuce

Le Grand gravelot se nourrit de petits invertébrés aquatiques qu'il trouve le long des rives des étangs ou dans les prairies.

Pluvier doré



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant
Présent entre mi-octobre et février

Caractéristiques

- Bec	court – fin – gris
- Tête	brune – blanche – beige
- Corps	dessus brun doré écaillé – ventre blanc
- Ailes	pointues – brun doré écaillé
- Pattes	longues – fines – sombres
- Queue	brune

Astuce

Le Pluvier doré s'associe souvent aux groupes de vanneaux huppés. Il se nourrit d'insectes aquatiques, de vers, de baies et de graines. Lors de la migration, les grands groupes de Pluviers dorés volent haut et l'on peut distinguer leurs cris flûtés de loin.

Vanneau huppé



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	court – pointu
- Tête	huppe longue, fine, recourbée, sombre – gorge et front noirs – menton et avant du cou blancs
- Corps	dos sombre vert bouteille – ventre blanc
- Ailes	large bout arrondi – reflets métalliques verts et violets
- Pattes	longues – fines – orangées rosées
- Queue	noire et blanche

Astuce

En vol, les groupes de Vanneaux huppés donnent une impression de « clignotement » avec une alternance de noir et de blanc correspondant aux battements des ailes.

Bécasseau maubèche



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent en mai ou septembre (passages en migrations)

Caractéristiques (plumage nuptial)

- Bec	droit – épais – longueur moyenne – sombre
- Tête	brun-roux
- Corps	trapu – brun-roux uniforme
- Ailes	écaillées gris-roux – pointues (en vol)
- Pattes	courtes – fines – sombres
- Queue	grise

Astuce

Le Bécasseau maubèche ne possède pas de doigt postérieur. L'adulte en période internuptial est uniformément gris. Il se nourrit d'invertébrés présents dans les vasières.

Bécasseau sanderling



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre mars et mai

Caractéristiques

- Bec	droit – épais – sombre
- Tête	grise
- Corps	couleur pâle – gris blanc – petites tâches noires
- Ailes	pointues (en vol) – noires et grises avec une barre alaire blanche
- Pattes	courtes – fines – noires
- Queue	noire et grise

Astuce

Le Bécasseau sanderling a la même taille que le bécasseau variable, mais il est plus trapu.

Tournepieuvre à collier



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent en mai ou septembre (passages en migrations)

Caractéristiques (plumage nuptial)

- Bec	pointu – conique – noir
- Tête	noire et blanche
- Corps	majoritairement blanc sur le dessous – motifs écaillés brun-roux sur le dessus
- Ailes	pointues (en vol) – noires et blanches
- Pattes	courtes – oranges
- Queue	noire et blanche

Astuce

Le Tournepieuvre à collier soulève du bec les galets et les algues afin de trouver des invertébrés.

Bécasseau variable



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre mars et novembre (passages en migrations)

Caractéristiques (plumage nuptial)

- Bec	long – droit – fin – sombre
- Tête	grise avec des nuances brunâtres
- Corps	tâches noires sur le ventre – nuance brun-roux sur le dos
- Ailes	pointues (en vol) – noires et grises
- Pattes	courtes – sombres
- Queue	noire – blanche – grise

Astuce

Le Bécasseau variable est un petit limicole assez commun en période de migration.

Bécasseau minute



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent en mai (migration de printemps) ou
entre août et octobre (migration d'automne)

Caractéristiques (plumage fin d'été)

- Bec	court – droit – pointe fine – gris
- Tête	grise avec des nuances brunâtres
- Corps	motifs écaillés (brun-roux) sur le dos (lignes blanches) – ventre blanc
- Ailes	pointues (en vol) – noires et grises
- Pattes	courtes – sombres
- Queue	grise

Astuce

Le Bécasseau minute peut se retrouver en compagnie du bécasseau variable lors de ses haltes migratoires. Son nom fait allusion à sa petite taille.

Chevalier sylvain



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre mars (migration de printemps) et octobre (migration d'automne)

Caractéristiques

- Bec	assez long – fin – droit – sombre
- Tête	grise avec un sourcil blanchâtre bien marqué en arrière de l'œil
- Corps	dos écaillé avec nets points blancs – ventre blanc – poitrine et flancs vaguement raillés
- Ailes	pointues (en vol) – sombres
- Pattes	fines – jaune verdâtre
- Queue	grise avec des barres noires étroites

Astuce

En vol, le Chevalier sylvain a les doigts qui dépassent de la queue.

Chevalier culblanc



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant

Présent toute l'année (migration de printemps, migration d'automne et hivernage)

Caractéristiques

- Bec	assez long – fin – droit – gris
- Tête	grise
- Corps	délimitation nette entre le ventre blanc et le reste du corps sombre (gris foncé) – dos finement pointilleux
- Ailes	pointues (en vol) – noirâtres (dessus et dessous)
- Pattes	longues – vertes grisâtres
- Queue	grise avec de larges barres noires

Astuce

Comme son nom l'indique, le Chevalier culblanc laisse voir en vol son croupion blanc et de larges barres noires sur la queue.

Chevalier guignette



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant

Présent toute l'année (migration de printemps,
migration d'automne et hivernage)

Caractéristiques

- Bec	court – fin – droit – gris
- Tête	brune
- Corps	dessus brun – épaules blanches (en forme de virgule) – ventre blanc
- Ailes	pointues (en vol) – sombres avec une nette barre alaire blanche
- Pattes	courtes – fines – jaunâtres
- Queue	longue – brune

Astuce

Le Chevalier guignette se reconnaît au hochement de sa tête (d'avant en arrière) et au balancement de son corps. En vol, son battement d'ailes est nerveux.

Chevalier gambette



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre mars (migration de printemps) et novembre (migration d'automne)

Caractéristiques (plumage internuptial)

- Bec	droit – assez épais – assez long – bicolore (base rouge orange et pointe noire)
- Tête	brune
- Corps	brun – dessus brunâtre – poitrine rayée – ventre blanc avec taches noires diffuses
- Ailes	pointues (en vol) – noires, blanches, grises
- Pattes	longues – rouge orange vif
- Queue	rayée

Astuce

Une zone blanche au croupion, pointue vers le dos se voit lorsque le Chevalier gambette vole.

Chevalier arlequin



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre avril (migration de printemps) et octobre (migration d'automne)

Caractéristiques (plumage internuptial)

- Bec	long – recourbé à la pointe – bicolore (sombre et orangé)
- Tête	brune
- Corps	dessus gris clair – dessous blanc sans motif
- Ailes	pointues (en vol) – noires, grises
- Pattes	longues – orangées
- Queue	rayée

Astuce

Le Chevalier arlequin en plumage nuptial est entièrement noir. En vol, la totalité de ses doigts dépasse de la queue et l'on peut apercevoir une tâche ovale blanche sur le dos.

Chevalier aboyeur



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Présent entre avril (migration de printemps) et novembre (migration d'automne)

Caractéristiques (plumage internuptial)

- Bec	long – épais – légèrement retroussé – sombre
- Tête	blanchâtre
- Corps	dessus gris clair (écailles pâles) – dessous blanchâtre
- Ailes	pointues (en vol)
- Pattes	claires – longues – fines
- Queue	pâle

Astuce

En vol, le Chevalier aboyeur possède une tâche ovale blanche sur le dos, large au niveau du croupion.

Barge à queue noire



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE



© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Caractéristiques

- Bec	quasiment droit – long – base orangée
- Tête	orangée
- Corps	poitrine et cou orangés – ventre et dos gris clair grossièrement tachetés
- Ailes	grise
- Pattes	longues – fines – grises
- Queue	noire et blanche

Astuce

La Barge à queue noire possède des pattes plus longues que la Barge rousse. En vol, elle diffère de cette dernière par la large barre alaire blanche, la queue noire et un carré blanc sur le croupion.

Bécassine des marais



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Caractéristiques

- Bec	très long – droit
- Tête	brune avec une raie médiane pâle
- Corps	brun avec de nettes bandes ocre-jaune sur la tête et le dos – flancs barrés – ventre blanc
- Ailes	brunes – net bord de fuite blanc (en vol)
- Pattes	courtes – fines

Astuce

La Bécassine des marais utilise son long bec pour sonder la vase à la recherche de petits animaux (vers, insectes, crustacés, mollusques...).

Combattant varié



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »
Migrateur

Caractéristiques (plumage internuptial)

- Bec	longueur moyenne – orangé avec la pointe noire
- Tête	brune – pâle autour de la racine du bec
- Corps	brun écaillé de noir – ventre blanc
- Ailes	brun-gris
- Pattes	longues – fines – orangées
- Queue	brune avec les côtés blancs

Astuce

En vol, le Combattant varié a les pattes qui dépassent beaucoup du corps. Lorsqu'il recherche sa nourriture au sol, les plumes de son manteau se redressent souvent à contre vent.

Mouette rieuse



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	court – orangé – large pointe noire
- Tête	blanche – nette tache parotique
- Corps	blanc – dessus gris
- Ailes	grises – dessous sombre
- Pattes	fines – orangées – palmées
- Queue	blanche – barre caudale terminale noire

Astuce

En hiver, la Mouette rieuse possède une virgule noire à l'arrière de l'œil. L'été, son plumage nuptial laisse apparaître un capuchon brun foncé (apparence noire). En colonie, elle est bruyante.

Mouette mélanocéphale



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE



© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur

Caractéristiques

- Bec	court – rouge sang – trait noir à la pointe
- Tête	entièrement noire
- Corps	blanc – dessus gris
- Ailes	blanches
- Pattes	courtes – fines – palmées – rouges
- Queue	blanche

Astuce

La Mouette mélanocéphale, moins fréquente que la rieuse, s'en distingue par la coloration rouge sang de son bec, son capuchon noire descendant un peu dans la nuque et ses ailes blanches. Son cri, miaulement typique « yéah » est également caractéristique.

Goéland leucophée



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur / Hivernant

Caractéristiques (plumage nuptial)

- Bec	fort – bout crochu – jaune avec une tache rouge – angle du gonyx saillant
- Tête	blanche – taches brunes
- Corps	manteau gris – dessus sombre – dessous clair
- Ailes	grises – large bande noire à la pointe des ailes
- Pattes	longues – fines – claires – jaunes
- Queue	sombre

Astuce

Les goélands juvéniles sont appelés grisards du fait de leur plumage gris-brun le premier hiver se transformant progressivement en plumage gris après le troisième hiver. Il est plus difficile d'identifier les juvéniles.

Mouette pygmée



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »
Migrateur

Caractéristiques (plumage juvénile)

- Bec	court – noir – fin
- Tête	blanche – taches noires
- Corps	dominante blanc – dessus avec des motifs sombres
- Ailes	dessus gris – motifs sombres en « W » barres des secondaires grises – dessous foncé
- Pattes	courtes – grises – palmées
- Queue	blanche et noire

Astuce

La Mouette pygmée est très petite (2/3 de la mouette rieuse). Son plumage nuptial laisse apparaître un capuchon noir.

Sterne naine



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Caractéristiques

- Bec	long – jaune – pointe noire
- Tête	noire avec le front blanc – petit cou
- Corps	dominante blanc – dessus gris
- Ailes	longues et étroites – grises
- Pattes	très courtes – palmées – orangées
- Queue	longue

Astuce

Comme les autres sternes, la Sterne naine possède de très fines ailes et une queue fourchue (visible en vol). Au repos, sa queue est cachée par ses longues ailes. Elle est très petite, à peu près la moitié de la Sterne pierregarin.

Sterne pierregarin



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur

Caractéristiques

- Bec	long – fin – droit – rouge orangé – pointe noire
- Tête	blanche – partie haute noire
- Corps	dominante blanc – dessus et dessous gris pâle
- Ailes	longues – grises
- Pattes	courtes – palmées – fines – rosées
- Queue	longue – fourchue

Astuce

La Sterne pierregarin est également surnommée l'hirondelle des mers en raison de sa ressemblance avec l'hirondelle. C'est la plus commune des sternes de la réserve. Son nom rappelle qu'elle aime se poser et nicher sur les sols pierreux.

Sterne arctique



Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Caractéristiques

- Bec	long – fin – droit – rouge orangé
- Tête	blanche – partie haute noire
- Corps	dominante blanc – dessus et dessous gris pâle
- Ailes	longues – grises
- Pattes	très courtes – palmées – fines – rosées
- Queue	longue – fourchue

Astuce

La Sterne arctique ressemble énormément à la Sterne pierregarin. Son plumage est cependant plus sombre avec une dominante grise. Son cou, son bec sont plus courts alors que sa queue est plus longue que la pierregarin.

Guifette noire



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Caractéristiques

- Bec	long – fin – droit – noir
- Tête	grand capuchon noir
- Corps	dominante gris – tache pectorale sombre – bas ventre blanc
- Ailes	longues – nettes pointes pâles
- Pattes	courtes – palmées – sombres
- Queue	grise – peu fourchue

Astuce

La Guifette noire possède une queue plus courte et moins fourchue que les sternes.

C'est la guifette la plus commune.

Guifette moustac



Réserve Naturelle
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Migrateur

Caractéristiques (plumage nuptial)

- Bec	long – fin – droit – sombre
- Tête	grand capuchon noir
- Corps	entièrement gris sombre
- Ailes	gris argenté pâle
- Pattes	courtes – palmées – fines – sombres
- Queue	courte – peu fourchue – gris clair

Astuce

La Guifette moustac est plus grande que les autres guifettes. Son croupion est plus gris que la sterne arctique et sa queue plus courte. Elle diffère de la Guifette noire par l'absence de tache sombre au niveau de la poitrine.

Martin-pêcheur d'Europe



Réserve Naturelle
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »

Nicheur / Migrateur / Hivernant
Présent toute l'année

Caractéristiques

- Bec	très long – noir chez le mâle – sombre et mandibule inférieure rouge chez la femelle
- Tête	calotte bleue verdâtre – gorge et côtés du cou blancs – tache orangée sur les joues
- Corps	dos bleu métallique – dessous orangé
- Ailes	bleues
- Pattes	très courtes – orangées
- Queue	bleue

Astuce

Le Martin-pêcheur est un petit oiseau trapu. Son bec est une arme efficace lors de la pêche. Il se déplace telle une flèche bleue éclatante, en émettant parfois un cri caractéristique.