



Réserve Naturelle  
**ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE**



# Guide Ornitho

*De la Réserve Naturelle Nationale des  
étangs et rigoles d'Yveline*

## ***Table des matières***

*Cliquez sur les noms des oiseaux pour accéder à leur fiche.*

Cygne tuberculé

Oie cendrée

Canard colvert

Canard chipeau

Canard pilet

Canard souchet

Canard siffleur

Sarcelle d'hiver

Sarcelle d'été

Fuligule milouin

Fuligule morillon

Grèbe à cou noir

Grèbe castagneux

Grèbe huppé

Butor étoilé

Blongios nain

Bihoreau gris

Héron garde-bœufs

Aigrette garzette

Grande aigrette

Héron cendré

Balbuzard pêcheur

Busard des roseaux

Avocette élégante

Échasse blanche

Petit gravelot

Grand gravelot

Pluvier doré  
Vanneau huppé  
Bécasseau maubèche  
Bécasseau sanderling  
Tournepierre à collier  
Bécasseau variable  
Bécasseau minute  
Chevalier sylvain  
Chevalier culblanc  
Chevalier guignette  
Chevalier gambette  
Chevalier arlequin  
Chevalier aboyeur  
Barge à queue noire  
Bécassine des marais  
Combattant varié  
Mouette rieuse  
Mouette mélanocéphale  
Goéland leucophée  
Mouette pygmée  
Sterne naine  
Sterne pierregarin  
Sterne arctique  
Guifette noire  
Guifette moustac  
Martin-pêcheur d'Europe

## ***Introduction***

Le guide ornitho de la réserve naturelle nationale des étangs et rigoles d'Yveline constitue une sélection d'espèces d'oiseaux d'eau observés sur l'**étang de Saint-Quentin-en-Yvelines** par les agents de la réserve (avec l'aide de bénévoles) sur la période 2012-2021. Parmi les 250 espèces d'oiseaux identifiés sur le site sur cette période, la liste des espèces présentées dans ce guide correspond aux espèces d'oiseaux inféodés aux zones humides et fréquemment observés sur le site (période de reproduction, période hivernale, périodes de migration).

La sélection de ces 53 espèces repose sur une méthodologie définie par la régularité des observations au cours du temps. Ceci permet d'établir un statut ornithologique pour chaque espèce (nicheur, migrateur, hivernant), allant des espèces *les plus régulièrement observées* (dont les 53 espèces de ce guide) aux espèces contactées *ponctuellement* (Flamant rose, absent de ce guide). Ce sont principalement ces espèces qui sont à l'origine de la création de la réserve naturelle (1986).

Voici la liste complémentaire non-exhaustive d'autres espèces d'oiseaux d'eau ne figurant pas dans ce guide mais pouvant être observées sur l'étang de Saint-Quentin et potentiellement sur les autres étangs de la réserve :

- Bernache du Canada
- Nette rousse
- Fuligule milouinan
- Garrot à œil d'or
- Harle bièvre
- Grand cormoran
- Héron pourpré
- Spatule blanche
- Râle d'eau

- Marouette ponctuée
- Foulque macroule
- Gallinule poule d'eau
- Pluvier argenté
- Bécasseau cocorli
- Bécasseau de Temminck
- Barge rousse
- Courlis cendré
- Courlis corlieu
- Bécassine sourde
- Goéland cendré
- Goéland argenté
- Goéland brun
- Phragmite des joncs
- Locustelle lusciniöide
- Bouscarle de Cetti
- Rousserolle effarvate
- Rousserolle verderole
- Panure à moustaches
- Rémiz penduline
- Bruant des roseaux

Des espèces d'oiseaux terrestres peuvent également être contactées :

- Milan noir
- Buse variable
- Epervier d'Europe
- Autour des palombes
- Faucon crécerelle
- Faucon hobereau
- Hibou moyen-duc
- Martinet noir
- Pic noir
- Pic vert
- Pic épeiche
- Pic mar
- Pic épeichette
- Hirondelle de rivage
- Hirondelle rustique
- Hirondelle de fenêtre
- Pipit spioncelle
- Pipit farlouse
- Pipit des arbres
- Bergeronnette grise
- Bergeronnette des ruisseaux
- Bergeronnette printanière
- Accenteur mouchet
- Rougegorge familier
- Rossignol philomèle
- Gorgebleue à miroir

- Grive musicienne
- Grive mauvis
- Grive draine
- Grive litorne
- Merle noir
- Fauvette des jardins
- Fauvette à tête noire
- Fauvette grise
- Locustelle tachetée
- Hypolaïs polyglotte
- Hypolaïs ictérine
- Pouillot fitis
- Pouillot véloce
- Roitelet à triple bandeau
- Roitelet huppé
- Gobemouche gris
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Mésange huppée
- Mésange nonette
- Mésange à longue queue
- Sittelle torchepot
- Grimpereau des jardins
- Pie bavarde
- Geai des chênes
- Choucas des tours
- Corneille noire

- Etourneau sansonnet
- Pinson des arbres
- Pinson du Nord
- Chardonneret élégant
- Verdier d'Europe
- Bouvreuil pivoine
- Grosbec casse-noyaux

Nous remercions grandement les bénévoles observateur·ices pour l'aide apportée à la connaissance ornithologique du site (transmission des données, veille, alerte...)



# Cygne tuberculé



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

## **Caractéristiques**

- Bec plat - rouge orange - tubercule frontal
- Tête blanche
- Corps blanc
- Ailes blanches
- Pattes palmées - noires
- Queue longue
- Autre très long cou

## **Astuce**

Le mâle possède un tubercule plus développé que la femelle, d'autant plus en période de nidification. Les juvéniles, au plumage gris, vont progressivement devenir blancs. Leur bec gris foncé sans tubercule deviendra petit à petit rouge orangé avec un tubercule frontal.



# Oie cendrée



Réserve Naturelle  
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant  
Présent d'octobre à mi-février

## **Caractéristiques**

- Bec plat et fort - orange rosé
- Tête gris brun
- Corps gris brun
- Ailes gris brun
- Pattes palmées - rouges
- Queue courte
- Autre cou long - épais - trapu

## **Astuce**

L'Oie cendrée est l'oie grise la plus commune observable dans la réserve ; l'Oie rieuse est rare et l'Oie des moissons très rare.



# Tadorne de Belon



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant  
Présent d'octobre à avril

### **Caractéristiques**

- Bec	plat - rouge - tubercule
- Tête	verte foncée - noire
- Corps	dominante blanc - bande pectorale brun roux
- Ailes	rémyges primaires noires rémyges secondaires vertes
- Pattes	palmées - roses
- Queue	blanche avec l'extrémité noire

### **Astuce**

Le tubercule frontal est plus gros chez le mâle que chez la femelle particulièrement en période de reproduction. Les couleurs du plumage du tadorne sont très nettement délimitées. Si ses teintes de plumes se rapprochent de celles du Canard souchet, le Tadorne de Belon est bien le plus grand des canards avec un long cou.



# Canard colvert



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

## **Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)**

- Bec plat - jaune
- Tête vert bouteille
- Corps dominante gris - poitrine brun - collier blanc
- Ailes miroir bleu entouré de bandes alaires blanches
- Pattes palmées - orangées
- Queue rectrices recourbées vers le haut

## **Astuce**

Il y a un net dimorphisme sexuel chez le Canard colvert. La femelle est brunâtre et son bec orangé. Le juvénile a un plumage ressemblant à celui de la femelle.

Après la période nuptiale, à l'approche de l'été, le mâle mue, il perd une partie de ses plumes (notamment les rémiges) ; on dit qu'il est en éclipse.



# Canard chipeau



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

## **Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)**

- Bec plat - sombre
- Tête brun terne
- Corps dominante gris - croupion noir
- Ailes présence d'un miroir blanc bordé de noir
- Pattes palmées - orangées
- Queue croupion noir

## **Astuce**

Il y a un net dimorphisme sexuel chez le Canard chipeau. La femelle chipeau ressemble beaucoup à la femelle colvert. Son bec est cependant bicolore (orange et gris) et son miroir est blanc. Le mâle chipeau connaît également une période de mue post-nuptiale et son plumage en éclipse ressemble à celui de la femelle.



# Canard pilet



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## ***Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »***

Migrateur / Hivernant

Présent de mi-septembre à mi-avril

## ***Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)***

- Bec plat - gris sombre
- Tête noire
- Corps poitrine et cou blancs
- Ailes étroites et pointues
- Pattes palmées - grises
- Queue « en flèche » longue et pointue
- Autre « languettes » fines blanches remontant vers la tête

## ***Astuce***

Il y a un net dimorphisme sexuel chez le Canard pilet. La femelle pilet ressemble beaucoup à la femelle colvert. Elle possède cependant un bec gris foncé. Le plumage du juvénile se rapproche de celui de la femelle.



# Canard souchet



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

## **Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)**

- Bec plat - proéminent - gris
- Tête vert bouteille - yeux jaunes
- Corps poitrine blanche - ventre blanc - flancs brun-roux
- Ailes couvertures bleues
- Pattes palmées - oranges
- Queue noire

## **Astuce**

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Canard souchet. La femelle souchet ressemble beaucoup à la femelle colvert avec un bec proéminent. Le plumage du juvénile et du mâle en éclipse (il mue en période post-nuptiale) se rapprochent de celui de la femelle.



# Canard siffleur



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## ***Statut « RNN Etangs et Rigoles d'Yveline »***

Migrateur / Hivernant

Présent de mi-septembre à mi-mai

## ***Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)***

- Bec plat - petit - gris clair avec la pointe noire
- Tête brun-roux - front et calotte jaunes
- Corps dominante gris - poitrine rosée - ventre blanc - « miroir » blanc
- Ailes grises avec une grande zone blanche
- Pattes palmées
- Queue noire

## ***Astuce***

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Canard siffleur. La femelle a des couleurs brun-roux ou grisâtre, le juvénile également ainsi que le mâle en éclipse.



# Sarcelle d'hiver



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

## **Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)**

- Bec plat - gris
- Tête brun-rouge - zone verte bordée d'une ligne jaune
- Corps dominante gris - poitrine claire
- Ailes raie blanche - miroir vert
- Pattes palmées
- Queue dessous jaune clair bordé de noir

## **Astuce**

C'est un petit canard.

Il y a un dimorphisme sexuel chez la Sarcelle d'hiver. La femelle est tachetée de brun, le juvénile également ainsi que le mâle en éclipse.

Les mâles émettent un sifflement clair.



# Sarcelle d'été



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Etangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent de mi-mars à mi-septembre

## **Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)**

- Bec plat - long - fort - gris
- Tête brune - sourcil épais blanc
- Corps dominante brun - flancs gris clair
- Ailes grises
- Pattes palmées
- Queue brune

## **Astuce**

Il y a un dimorphisme sexuel chez la Sarcelle d'été. La femelle Sarcelle d'été ressemble à la femelle Sarcelle d'hiver mais elle est plus grande. Le mâle Sarcelle d'été émet un bruit de crécelle sec.



# Fuligule milouin



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Etangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

## **Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)**

- Bec plat - noir avec zone pâle
- Tête brun-rouille - yeux rouges
- Corps dominante gris - poitrine noire
- Ailes grises
- Pattes palmées
- Queue courte - noire

## **Astuce**

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Fuligule milouin. La femelle est gris-brunâtre avec la poitrine, le cou et la calotte brunâtres plus foncés. Les juvéniles lui ressemblent.



# Fuligule morillon



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

## **Caractéristiques du mâle (plumage nuptial)**

- Bec plat - gris clair avec la pointe noire
- Tête noire avec une huppe - yeux rouges
- Corps dominante noir (poitrine, dos et queue) - flancs et ventre blancs
- Ailes noire avec une barre alaire blanche
- Pattes palmées
- Queue noire

## **Astuce**

Il y a un dimorphisme sexuel chez le Fuligule morillon. La femelle est brune avec les flancs plus clairs. Les juvéniles lui ressemblent. Les mâles en éclipse ont les flancs bruns.



# Grèbe à cou noir



Réserve Naturelle  
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent de mars à mi-juillet

### **Caractéristiques**

- Bec pointu - petit
- Tête noire - plumets jaunes - yeux rouges
- Corps dominante noir (poitrine, dos, cou et tête) - flancs brun-roux
- Ailes noire avec une barre alaire blanche
- Pattes lobées
- Queue quasi inexistante

### **Astuce**

Le Grèbe à cou noir en plumage internuptial a perdu ses couleurs chaudes (flancs gris, tête noire et blanche). Comme les autres grèbes, il va plonger pour se nourrir. Il avale ses proies sous l'eau.



# Grèbe castagneux



Réserve Naturelle  
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

### **Caractéristiques**

- Bec pointu - petit
- Tête noire - commissures jaunes claires
- Corps dominante noir avec un cou et des joues brun-rouge
- Ailes noire avec une tache blanche
- Pattes lobées
- Queue quasi inexistante

### **Astuce**

Le Grèbe castagneux est le plus petit des grèbes. L'adulte en plumage internuptial est plus terne. Comme les autres grèbes, il va plonger pour se nourrir. Le Grèbe castagneux a un régime diversifié : insectes, poissons, mollusques, crustacés, œufs d'amphibiens ...



# Grèbe huppé



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

### **Caractéristiques**

- Bec pointu - long - fin - couleur pâle
- Tête plumes noires pouvant se dresser en huppe - joues brun-roux
- Corps allongé - dominante clair - dos sombre
- Ailes noires avec des taches blanches à l'avant et à l'arrière de l'aile
- Pattes lobées
- Queue quasi inexistante

### **Astuce**

Le Grèbe huppé est le plus grand grèbe et le plus répandu. La parade nuptiale correspond à une danse en miroir entre la femelle et le mâle, cou dressé se repliant et pouvant aller jusqu'à une posture verticale du corps.



# Butor étoilé



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant

Présent de mi-novembre à mi-mars

## **Caractéristiques**

- Bec      pointu - long - droit
- Tête      brun-chamois - « moustaches » noires
- Corps    brun-chamois - trapu
- Ailes    larges - brunes
- Pattes   longueur moyenne - longs doigts
- Queue   petite

## **Astuce**

Pour se camoufler dans les roseaux, le Butor étoilé imite les roseaux, en étirant son cou et en pointant son bec vers le ciel.



# Blongios nain



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur

Présent entre mai et mi-septembre

### **Caractéristiques du mâle**

- Bec pointu - long - droit
- Tête grise - calotte et dessus noirs
- Corps dominante brun-chamois (légèrement strié) - dos noir
- Ailes noires - tache alaire blanc-beigeâtre « dans le noir »
- Pattes longues - longs doigts
- Queue petite

### **Astuce**

Le Blongios nain est un « héron » de petite taille. La femelle a le dos brun strié de noir ; les stries du cou et des flancs sont plus marquées.



# Bihoreau gris



Réserve Naturelle  
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur  
Présent entre juin et août

## **Caractéristiques**

- Bec pointu - court - droit - noir
- Tête blanche - calotte noire - aigrettes (grandes plumes) blanches
- Corps dominante gris pâle - dos gris ardoise trapu
- Ailes gris pâle
- Pattes longues - longs doigts
- Queue petite

## **Astuce**

Le Bihoreau gris est un « héron » de taille moyenne surtout actif au crépuscule et la nuit. Le jour, il dort dans les arbres.



# Héron garde-bœufs



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur

Présent entre avril et octobre

## **Caractéristiques**

- Bec pointu - court - droit - jaune (rosé en période de reproduction)
- Tête blanche - calotte orangée
- Corps blanc - plumes orangées sur la poitrine et sur le dos - trapu
- Ailes blanches
- Pattes longues - couleur sombre - longs doigts
- Queue petite

## **Astuce**

Le Héron garde-bœufs est un « héron » de petite taille. C'est lui qui vient en groupe dans les champs où pâture le bétail pour se nourrir des insectes champêtres.



# Aigrette garzette



Réserve Naturelle  
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent entre mai et décembre

### **Caractéristiques**

- Bec      pointu - long - droit - noir
- Tête     blanche - aigrettes (deux longues plumes fines) blanches
- Corps    blanc - long cou
- Ailes     blanches
- Pattes    longues - noires - longs doigts jaunes
- Queue    blanche

### **Astuce**

L'Aigrette garzette est un « héron » de taille moyenne qui se nourrit de grenouilles, de poissons ...



# Grande aigrette



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

### **Caractéristiques**

- Bec pointu - long - droit - jaune
- Tête blanche
- Corps blanc - long cou
- Ailes blanches
- Pattes longues - sombres
- Queue blanche

### **Astuce**

La Grande aigrette est un « héron » de grande taille qui se nourrit de grenouilles, de poissons ... Les adultes nicheurs vont avoir un bec plus sombre que ceux qui ne nichent pas.



# Héron cendré



Reserve Naturelle  
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

### **Caractéristiques**

- Bec pointu - long - droit - jaune
- Tête blanche et noire - longue plume nucale noire
- Corps dominante gris - gris / noir / blanc
- Ailes grises
- Pattes longues - jaunes
- Queue grise

### **Astuce**

En vol, le Héron cendré a le cou replié et les pattes étendues avec les doigts resserrés. Il niche en groupe en faisant de grands nids en haut des arbres ; c'est ce que l'on appelle les héronnières.

Vidéo de la héronnière



# Balbusard pêcheur



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre mi-mars et mi-octobre  
(+ quelques données hivernales)

### **Caractéristiques**

- Bec crochu
- Tête calotte blanche - bande marron sur les yeux
- Corps dominante blanc - dessus brun-gris
- Ailes digitées - dominante brun sombre
- Pattes serres
- Queue en forme d'éventail en vol - finement barrée

### **Astuce**

Le Balbusard pêcheur se nourrit exclusivement de poissons qu'il détecte depuis les airs. Il plonge alors sur les poissons, serres en avant.



# Busard des roseaux



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur

Présent entre mi-mars et novembre

## **Caractéristiques du mâle**

- Bec crochu
- Tête blanc-jaunâtre
- Corps brun-roux - dos et ventre bruns
- Ailes digitées - grises - dessous et dessus des ailes tricolores - pointes noires
- Pattes serres
- Queue longue - forme « plate » - gris-bleu clair uni

## **Astuce**

Le Busard des roseaux chasse en rasant les milieux, ailes en V, à la recherche de petits mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens... La femelle de couleur brun foncé possède une calotte et un cou blanc moiré.



# Avocette élégante



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre avril et mai  
(+ quelques données en octobre)

### **Caractéristiques**

- Bec fin - long - retroussé - noir
- Tête blanche - front, calotte et nuque noirs
- Corps dominante blanc - un peu de noir
- Ailes noires et blanches
- Pattes longues - palmées - grises
- Queue blanche

### **Astuce**

L'Avocette élégante pêche les invertébrés de manière typique avec des mouvements latéraux du bec dans l'eau ou la vase liquide.



# Échasse blanche



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre avril et juin

## **Caractéristiques**

- Bec pointu - long - fin - noir
- Tête blanche et noire
- Corps blanc
- Ailes noires - pointues
- Pattes très longues - fines - roses
- Queue longue - pointue

## **Astuce**

L'Échasse blanche est un limicole gracile et « élégant ». En vol, son cou et ses pattes sont en extension. Chez la femelle, la tête est blanche et grise, comme chez les juvéniles.



# Petit gravelot



**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre mars et novembre

## **Caractéristiques**

- Bec court – fin – sombre
- Tête calotte marron et noire séparée par une ligne blanche - cercles orbitaires de couleur jaune
- Corps dos gris-brun - ventre blanc - collier noir
- Ailes brunes
- Pattes longues - roses ternes
- Queue noire et blanche

## **Astuce**

Le Petit gravelot est un peu plus petit que le Grand gravelot. Son bec est plus étroit et long, il paraît avoir des pattes plus longues et il n'a pas de barre alaire blanche.



# Grand gravelot



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre mars et novembre

## **Caractéristiques**

- Bec court - droit - épais - bicolore (orange avec la pointe noire)
- Tête calotte brune sans délimitation blanche
- Corps dominant blanc - dos gris-brun
- Ailes brunes - barre alaire blanche
- Pattes courtes - orangées
- Queue noire - blanche

## **Astuce**

Le Grand gravelot se nourrit de petits invertébrés aquatiques qu'il trouve le long des rives des étangs ou dans les prairies.



# Pluvier doré



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant

Présent entre mi-octobre et février

### **Caractéristiques**

- Bec court - fin - gris
- Tête brune - blanche - beige
- Corps dessus brun doré écaillé - ventre blanc
- Ailes pointues - brun doré écaillé
- Pattes longues - fines - sombres
- Queue brune

### **Astuce**

Le Pluvier doré s'associe souvent aux groupes de vanneaux huppés. Il se nourrit d'insectes aquatiques, de vers, de baies et de graines. Lors de la migration, les grands groupes de Pluviers dorés volent haut et l'on peut distinguer leurs cris flûtés de loin.



# Vanneau huppé



Réserve Naturelle  
ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

### **Caractéristiques**

- Bec court - pointu
- Tête huppe longue, fine, recourbée, sombre - gorge et front noirs - menton et avant du cou blancs
- Corps dos sombre vert bouteille - ventre blanc
- Ailes large bout arrondi - reflets métalliques verts et violets
- Pattes longues - fines - orangées rosées
- Queue noire et blanche

### **Astuce**

En vol, les groupes de Vanneaux huppés donnent une impression de « clignotement » avec une alternance de noir et de blanc correspondant aux battements des ailes.



# Bécasseau maubèche



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent en mai ou septembre (passages en migrations)

## **Caractéristiques (plumage nuptial)**

- Bec droit - épais - longueur moyenne - sombre
- Tête brun-roux
- Corps trapu - brun-roux uniforme
- Ailes écaillées gris-roux - pointues (en vol)
- Pattes courtes - fines - sombres
- Queue grise

## **Astuce**

Le Bécasseau maubèche ne possède pas de doigt postérieur. L'adulte en période internuptial est uniformément gris. Il se nourrit d'invertébrés présents dans les vasières.



# Bécasseau sanderling



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre mars et mai

## **Caractéristiques**

- Bec droit - épais - sombre
- Tête grise
- Corps couleur pâle - gris blanc - petites tâches noires
- Ailes pointues (en vol) - noires et grises avec une barre alaire blanche
- Pattes courtes - fines - noires
- Queue noire et grise

## **Astuce**

Le Bécasseau sanderling a la même taille que le bécasseau variable, mais il est plus trapu.



# Tournepierre à collier



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent en mai ou septembre (passages en migrations)

## ***Caractéristiques (plumage nuptial)***

- Bec pointu - conique - noir
- Tête noire et blanche
- Corps majoritairement blanc sur le dessous - motifs écaillés brun-roux sur le dessus
- Ailes pointues (en vol) - noires et blanches
- Pattes courtes - oranges
- Queue noire et blanche

## ***Astuce***

Le Tournepierre à collier soulève du bec les galets et les algues afin de trouver des invertébrés.



# Bécasseau variable



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## ***Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »***

Migrateur

Présent entre mars et novembre (passages en migrations)

## ***Caractéristiques (plumage nuptial)***

- Bec long - droit - fin - sombre
- Tête grise avec des nuances brunâtres
- Corps tâches noires sur le ventre - nuance brun-roux sur le dos
- Ailes pointues (en vol) - noires et grises
- Pattes courtes - sombres
- Queue noire - blanche - grise

## ***Astuce***

Le Bécasseau variable est un petit limicole assez commun en période de migration.



# Bécasseau minute



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## ***Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »***

Migrateur

Présent en mai (migration de printemps) ou  
entre août et octobre (migration d'automne)

## ***Caractéristiques (plumage fin d'été)***

- Bec court - droit - pointe fine - gris
- Tête grise avec des nuances brunâtres
- Corps motifs écaillés (brun-roux) sur le dos (lignes blanches) - ventre blanc
- Ailes pointues (en vol) - noires et grises
- Pattes courtes - sombres
- Queue grise

## ***Astuce***

Le Bécasseau minute peut se retrouver en compagnie du bécasseau variable lors de ses haltes migratoires. Son nom fait allusion à sa petite taille.



# Chevalier sylvain



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre mars (migration de printemps) et octobre (migration d'automne)

## **Caractéristiques**

- Bec assez long - fin - droit - sombre
- Tête grise avec un sourcil blanchâtre bien marqué en arrière de l'œil
- Corps dos écaillé avec nets points blancs - ventre blanc - poitrine et flancs vaguement raillés
- Ailes pointues (en vol) - sombres
- Pattes fines - jaune verdâtre
- Queue grise avec des barres noires étroites

## **Astuce**

En vol, le Chevalier sylvain a les doigts qui dépassent de la queue.



# Chevalier culblanc



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant

Présent toute l'année (migration de printemps, migration d'automne et hivernage)

## **Caractéristiques**

- Bec assez long - fin - droit - gris
- Tête grise
- Corps délimitation nette entre le ventre blanc et le reste du corps sombre (gris foncé) - dos finement pointilleux
- Ailes pointues (en vol) - noirâtres (dessus et dessous)
- Pattes longues - vertes grisâtres
- Queue grise avec de larges barres noires

## **Astuce**

Comme son nom l'indique, le Chevalier culblanc laisse voir en vol son croupion blanc et de larges barres noires sur la queue.



# Chevalier guignette



## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant

Présent toute l'année (migration de printemps, migration d'automne et hivernage)

## **Caractéristiques**

- Bec court – fin – droit – gris
- Tête brune
- Corps dessus brun - épaules blanches (en forme de virgule) – ventre blanc
- Ailes pointues (en vol) - sombres avec une nette barre alaire blanche
- Pattes courtes - fines - jaunâtres
- Queue longue - brune

## **Astuce**

Le Chevalier guignette se reconnaît au hochement de sa tête (d'avant en arrière) et au balancement de son corps. En vol, son battement d'ailes est nerveux.



# Chevalier gambette



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre mars (migration de printemps) et novembre (migration d'automne)

## **Caractéristiques (plumage internuptial)**

- Bec droit - assez épais - assez long - bicolore (base rouge orange et pointe noire)
- Tête brune
- Corps brun - dessus brunâtre - poitrine rayée - ventre blanc avec tâches noires diffuses
- Ailes pointues (en vol) - noires, blanches, grises
- Pattes longues - rouge orange vif
- Queue rayée

## **Astuce**

Une zone blanche au croupion, pointue vers le dos se voit lorsque le Chevalier gambette vole.



# Chevalier arlequin



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre avril (migration de printemps) et octobre (migration d'automne)

## **Caractéristiques (plumage internuptial)**

- Bec long - recourbé à la pointe - bicolore (sombre et orangé)
- Tête brune
- Corps dessus gris clair - dessous blanc sans motif
- Ailes pointues (en vol) - noires, grises
- Pattes longues - orangées
- Queue rayée

## **Astuce**

Le Chevalier arlequin en plumage nuptial est entièrement noir. En vol, la totalité de ses doigts dépasse de la queue et l'on peut apercevoir une tâche ovale blanche sur le dos.



# Chevalier aboyeur



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur

Présent entre avril (migration de printemps) et novembre (migration d'automne)

## **Caractéristiques (plumage internuptial)**

- Bec long - épais - légèrement retroussé - sombre
- Tête blanchâtre
- Corps dessus gris clair (écailles pâles) - dessous blanchâtre
- Ailes pointues (en vol)
- Pattes claires - longues - fines
- Queue pâle

## **Astuce**

En vol, le Chevalier aboyeur possède une tâche ovale blanche sur le dos, large au niveau du croupion.



# Barge à queue noire



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE



© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## **Caractéristiques**

- Bec      quasiment droit - long - base orangée
- Tête      orangée
- Corps    poitrine et cou orangés - ventre et dos gris clair grossièrement tachetés
- Ailes    grise
- Pattes    longues - fines - grises
- Queue    noire et blanche

## **Astuce**

La Barge à queue noire possède des pattes plus longues que la Barge rousse. En vol, elle diffère de cette dernière par la large barre alaire blanche, la queue noire et un carré blanc sur le croupion.



# Bécassine des marais



**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## **Caractéristiques**

- Bec très long - droit
- Tête brune avec une raie médiane pâle
- Corps brun avec de nettes bandes ocre-jaune sur la tête et le dos - flancs barrés - ventre blanc
- Ailes brunes - net bord de fuite blanc (en vol)
- Pattes courtes - fines

## **Astuce**

La Bécassine des marais utilise son long bec pour sonder la vase à la recherche de petits animaux (vers, insectes, crustacés, mollusques...).



# Combattant varié



**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## ***Caractéristiques (plumage internuptial)***

- Bec longueur moyenne - orangé avec la pointe noire
- Tête brune - pâle autour de la racine du bec
- Corps brun écaillé de noir - ventre blanc
- Ailes brun-gris
- Pattes longues - fines - orangées
- Queue brune avec les côtés blancs

## ***Astuce***

En vol, le Combattant varié a les pattes qui dépassent beaucoup du corps. Lorsqu'il recherche sa nourriture au sol, les plumes de son manteau se redressent souvent à contre vent.



# Mouette rieuse



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

### **Caractéristiques**

- Bec court - orangé - large pointe noire
- Tête blanche - nette tache parotique
- Corps blanc - dessus gris
- Ailes grises - dessous sombre
- Pattes fines - orangées - palmées
- Queue blanche - barre caudale terminale noire

### **Astuce**

En hiver, la Mouette rieuse possède une virgule noire à l'arrière de l'œil. L'été, son plumage nuptial laisse apparaître un capuchon brun foncé (apparence noire). En colonie, elle est bruyante.



# Mouette mélanocéphale



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE



© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur

## **Caractéristiques**

- Bec court - rouge sang - trait noir à la pointe
- Tête entièrement noire
- Corps blanc - dessus gris
- Ailes blanches
- Pattes courtes - fines - palmées - rouges
- Queue blanche

## **Astuce**

La Mouette mélanocéphale, moins fréquente que la rieuse, s'en distingue par la coloration rouge sang de son bec, son capuchon noir descendant un peu dans la nuque et ses ailes blanches. Son cri, miaulement typique « yéah » est également caractéristique.



# Goéland leucophée



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Migrateur / Hivernant

## ***Caractéristiques (plumage nuptial)***

- Bec fort - bout crochu - jaune avec une tache rouge - angle du gonys saillant
- Tête blanche - taches brunes
- Corps manteau gris - dessus sombre - dessous clair
- Ailes grises - large bande noire à la pointe des ailes
- Pattes longues - fines - claires - jaunes
- Queue sombre

## ***Astuce***

Les goélands juvéniles sont appelés grisards du fait de leur plumage gris-brun le premier hiver se transformant progressivement en plumage gris après le troisième hiver. Il est plus difficile d'identifier les juvéniles.



# Mouette pygmée



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## ***Caractéristiques (plumage juvénile)***

- Bec court - noir - fin
- Tête blanche - taches noires
- Corps dominante blanc - dessus avec des motifs sombres
- Ailes dessus gris - motifs sombres en « W »  
barres des secondaires grises -  
dessous foncé
- Pattes courtes - grises - palmées
- Queue blanche et noire

## ***Astuce***

La Mouette pygmée est très petite (2/3 de la mouette rieuse). Son plumage nuptial laisse apparaître un capuchon noir.



# Sterne naine



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## **Caractéristiques**

- Bec long - jaune - pointe noire
- Tête noire avec le front blanc - petit cou
- Corps dominante blanc - dessus gris
- Ailes longues et étroites - grises
- Pattes très courtes - palmées - orangées
- Queue longue

## **Astuce**

Comme les autres sternes, la Sterne naine possède de très fines ailes et une queue fourchue (visible en vol). Au repos, sa queue est cachée par ses longues ailes. Elle est très petite, à peu près la moitié de la Sterne pierregarin.



# Sterne pierregarin



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur

## **Caractéristiques**

- Bec long - fin - droit - rouge orangé - pointe noire
- Tête blanche - partie haute noire
- Corps dominante blanc - dessus et dessous gris pâle
- Ailes longues - grises
- Pattes courtes - palmées - fines - rosées
- Queue longue - fourchue

## **Astuce**

La Sterne pierregarin est également surnommée l'hirondelle des mers en raison de sa ressemblance avec l'hirondelle. C'est la plus commune des sternes de la réserve. Son nom rappelle qu'elle aime se poser et nicher sur les sols pierreux.



# Sterne arctique



**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## **Caractéristiques**

- Bec long - fin - droit - rouge orangé
- Tête blanche - partie haute noire
- Corps dominante blanc - dessus et dessous gris pâle
- Ailes longues - grises
- Pattes très courtes - palmées - fines - rosées
- Queue longue - fourchue

## **Astuce**

La Sterne arctique ressemble énormément à la Sterne pierregarin. Son plumage est cependant plus sombre avec une dominante grise. Son cou, son bec sont plus courts alors que sa queue est plus longue que la pierregarin.



# Guifette noire



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## **Caractéristiques**

- Bec long - fin - droit - noir
- Tête grand capuchon noir
- Corps dominante gris - tache pectorale sombre - bas ventre blanc
- Ailes longues - nettes pointes pâles
- Pattes courtes - palmées - sombres
- Queue grise - peu fourchue

## **Astuce**

La Guifette noire possède une queue plus courte et moins fourchue que les sternes.  
C'est la guifette la plus commune.



# Guifette moustac



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE

© François Coquard

**Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**  
Migrateur

## ***Caractéristiques (plumage nuptial)***

- Bec long - fin - droit - sombre
- Tête grand capuchon noir
- Corps entièrement gris sombre
- Ailes gris argenté pâle
- Pattes courtes - palmées - fines - sombres
- Queue courte - peu fourchue - gris clair

## ***Astuce***

La Guifette moustac est plus grande que les autres guifettes. Son croupion est plus gris que la sterne arctique et sa queue plus courte. Elle diffère de la Guifette noire par l'absence de tache sombre au niveau de la poitrine.



# Martin-pêcheur d'Europe



Réserve Naturelle  
ETANGS ET RIGOLES D'YVELINE



© François Coquard

## **Statut « RNN Étangs et Rigoles d'Yveline »**

Nicheur / Migrateur / Hivernant  
Présent toute l'année

### **Caractéristiques**

- Bec très long - noir chez le mâle - sombre et mandibule inférieure rouge chez la femelle
- Tête calotte bleue verdâtre - gorge et côtés du cou blancs - tache orangée sur les joues
- Corps dos bleu métallique - dessous orangé
- Ailes bleues
- Pattes très courtes - orangées
- Queue bleue

### **Astuce**

Le Martin-pêcheur est un petit oiseau trapu. Son bec est une arme efficace lors de la pêche. Il se déplace telle une flèche bleue éclatante, en émettant parfois un cri caractéristique.

## Réalisation du guide

**Stagiaires** : Louise Batlle, Bilal Gakou et Vladimir Herbin

**Équipe de la réserve** : Solen Boivin, Cyril Fleury, Julien Godon et Joanne Anglade

**Crédits photo** : François Coquart

## Nos partenaires



### DRIEAT Île-de-France

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports



### Yvelines

Le Département



## Nous contacter

**Téléphone** : 01 71 49 71 82

**Site internet** : [www.reservenaturelle78.fr](http://www.reservenaturelle78.fr)

**Adresse mail** : [reserve@smager.fr](mailto:reserve@smager.fr)

**Adresses** :

- Maison de la Réserve : Île de loisirs Saint-Quentin-en-Yvelines, RD 912, Rond-point Éric Tabarly 78190 Trappes
- Maison de Saint-Hubert : Route de Saint-Hubert, D991 78610 Le Perray-en-Yvelines



@reservenaturelle78



Réserve Naturelle Nationale des étangs et rigoles d'Yveline



Réserve Naturelle  
**ÉTANGS ET RIGOLES D'YVELINE**

